

STRISCE ANTI-VARROA



APISTAN®

STRISCE ANTI-VARROA PER API PRONTE ALL'IMPIEGO

CONFEZIONE

Sacchetto da 10 strisce da 8 grammi

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Fluvalinate 10 g

Eccipienti q. b. a 100,0 g

Apistan® é marchio registrato Vita (Europe) Ltd., Basingstoke (UK)

PRECAUZIONI PARTICOLARI:

- Non ingerire
- Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande e da recipienti destinati a contenerne.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le strisce nella loro confezione originale ben chiusa al riparo dall'esposizione diretta della luce solare e in luogo asciutto.
- Conservare lontano da sostanze chimiche che potrebbero contaminarle.
- Utilizzare le strisce subito una volta aperta la confezione per evitare la contaminazione.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Usare guanti adatti.
- Non fumare, né bere, né mangiare durante la manipolazione del prodotto.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Non riutilizzare le strisce.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le strisce usate e le confezioni che contenevano il prodotto.
- In caso di ingestione accidentale consultare immediatamente il medico.

AVVERTENZE:

- Non lasciare le strisce nell'alveare per un periodo più prolungato di 6-10 settimane in modo da non favorire l'avvio di eventuali processi di resistenza.
- Non riutilizzare a scopi alimentari il miele raccolto durante il trattamento.
- Non utilizzare la cera del nido prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sospensione del trattamento.
- Il prodotto come tutti i piretroidi può dare sensibilizzazione allergica.

CONTROINDICAZIONI:

Nessuna conosciuta.


INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il fluvalinate blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

PER USO VETERINARIO

LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
ALLE FARMACIE E NON E' SOTTOPOSTA
ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA

DA NON VENDERSI SFUSO



10 STRISCE APISTAN®

STRISCE ANTI-VARROA



APISTAN®

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO



L'applicazione di due strisce per alveare poste entro i telaini 3 e 4 e 7 e 8 permette di ottenere l'eliminazione di *Varroa destructor* in un periodo di tempo compreso tra le 6 e 10 settimane a seconda delle condizioni ambientali e della presenza o meno di covata.

Non superare le dosi consigliate.

COME APPLICARE LE STRISCE

Seguire le indicazioni del disegno.

Per inserire Apistan all'interno dell'alveare è sufficiente introdurre la striscia tra i telaini, aprendo le alette e appoggiandole sui telaini.



EPOCA DI TRATTAMENTO

Per ottenere i migliori risultati trattare preferibilmente gli alveari a fine inverno o inizio autunno. Per entrambe le epoche di applicazione le strisce non vanno lasciate nell'alveare per più di 6-10 settimane.

Trattare tutti gli alveari per evitare i rischi di reinfestazione.

Le strisce possono anche essere utilizzate per la diagnosi della Varroa; in questo caso introdurre una striscia tra i telaini centrali per un periodo di una settimana con l'accorgimento di predisporre un telaino diagnostico sul fondo dell'alveare per la raccolta degli acari caduti.

NON TRATTARE LE API DURANTE LA PRODUZIONE DEL MIELE

TEMPO DI SOSPENSIONE: 0 giorni.

DATA DI SCADENZA: vedi lato del sacchetto.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Temperatura di conservazione: inferiore a 40°C

VALIDITA': 3 anni.

AIC n° 103222016



VITA (EUROPE) LIMITED
21/23 Wote Street, Basingstoke
Hampshire RG21 7NE (UK)

Officina di produzione:
Central Life Sciences - 12200 Denton Drive - Dallas - TX 75234 (USA)

Officina responsabile controllo lotti di produzione:
Buckingham Pharmaceutical Services Limited - 4 Station Enterprises,
Station Road - Abergavenny, Monmouthshire NP7 5HY (UK)