

Concepito per ottimizzare il monitoraggio dell'infestazione di varroa

- Costruito con materiali plastici solidi
- Prodotto durevole e riutilizzabile

- Coperchio impermeabile per un uso pratico e comodo

- Due tacche per misurare 200 o 300 api

- Disegnato per l'efficacia: Fori di uscita alla base e lungo i lati per ottimizzare la caduta delle varroe

- Il fondo trasparente permette una conta delle varroe accurata ed affidabile



Quando e come fare il monitoraggio?

► QUANDO

Ogni qualvolta si voglia conoscere il grado d'infestazioni degli alveari.



► MAGGIO/GIUGNO

Per valutare le tempistiche d'intervento antivarroa di luglio/agosto.

► SETTEMBRE/MARZO

Per valutare il grado di pulizia o la necessità d'intervenire con un trattamento in questi periodi.



► COME

Prelevare 200-300 api da un favo con covata.

Quanti alveari campionare?

1-5 alveari	→ tutti	La scelta degli alveari dev'essere casuale
6-20 alveari	→ almeno 5	
> 20 alveari	→ almeno 8	

Come calcolare la percentuale d'infestazione?

- Se è stato usato un campione di 300 api, dividere per 3 il numero d'acari.
- Per un campione di 200 api, dividere per 2 il numero d'acari.



Come valutare il risultato

- < 2% di varroe: non occorre un trattamento tempestivo
- tra 2% e 5% di varroe: occorre trattare in tempi rapidi
- > 5% di varroe: trattare immediatamente

MONITORAGGIO DELLA VARROA 3 metodi di monitoraggio racchiusi in un solo strumento!




Alcol



Zucchero a velo



Anidride carbonica



Nuovo
3 in 1

