

Varterminator

ACIDO FORMICO 36%

SCHEDA TECNICA

FORMA FARMACEUTICA
360 mg/g Tavoletta in gel per api - Acido formico

TITOLINE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Iscritta al Registro Veterinario - Via S. Zeno 99/A - 25124 Brescia

INDICAZIONE DEL PRINCIPATIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI
1 g di prodotto contiene:
Principio attivo: Acido formico 0,360 g
Loperidolo: 0,4 g

FORMA FARMACEUTICA
Tavoletta in gel, impregnata e priva di residui di gelatina idrolizzata, contenuta in un contenitore di plastica con fasciolo di colore fluorescente.

CONFEZIONE
7 tavolette da 250 g

INDICAZIONI D'USO
Trattamento delle api (Apis mellifera) affette da infestazione da Varroa destructor.

PROCEDURA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Trattamento dell'alveare: applicare due tavolette da 250 g e sostituirle con altre due dopo 10 giorni.

TEMPO DI ATTESA
Nella vera ape.


NUMERO A.C.
184739010

MEDICINALE NON SOGGETTO A PRESCRIZIONE MEDICA VETERINARIA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL ESPERTO REGISTRATO DEL PRODOTTO.

APPENDICI IN AGGIUNTA ALLA BUSTA.



Trattamento dell'alveare: Applicare due gel in sacchetti da 250 g e sostituirli con altri due dopo 10 giorni. Metodo di somministrazione: aprire l'alveare, rimuovere il film di copertura della vaschetta, rovesciare il sacchetto contenente il gel sulla parte superiore del telaio. Inclinare l'orlo con il capillare rovesciato al fine di garantire un adeguato volume d'aria tra il gel e il capillare. È consigliato il trattamento con temperatura media giornaliera compresa tra i 15 °C e i 25 °C.



IZO
via San Zeno, 99/A
25124 Brescia - Italia
T +39.030.2420553 • F +39.030.2420550
izo@izo.it • www.izo.it